

ANTI SCHURFT (Räude)

Tierarzneimittel zur Verwendung bei Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten und Mäusen. Eine Infektion mit (Räude-)Milben ist sehr ansteckend, da diese Infektion ein geschwächtes Immunsystem sehr leicht überlisten kann. Eine zu hohe Umgebungstemperatur, schlechte Belüftung, unhygienische Lebensbedingungen und ein Mangel an Nährstoffen erhöhen dann auch das Risiko einer Infektion mit (Räude-)Milben. Die ersten Anzeichen einer Milbeninfektion sind Rötungen auf der Haut und starker Juckreiz. Die Haut schwillt an und es entstehen kleine Wunden mit Schorf rundum Augen und Ohren. Diese Wunden können einen neuen Infektionsherd darstellen und dem Tier somit noch mehr Schmerzen bereiten. Das betroffene Tier frisst und trinkt weniger und ohne eine passende Behandlung kann dies schließlich zum Tod führen.

Indikation: (Räude-)Milbe

Dosierung: Schützen Sie während der Anwendung den Kopf des Tieres. Von einem Abstand von ca. 30 cm kurz sprühen. Dabei das Fell von hinten nach vorne gegen den Wuchs befeuchten. Achten Sie dabei darauf, dass die Flüssigkeit die Haut berührt, damit die Milben auch absterben.

Ausgewachsene Meerschweinchen: 5-6x kurz besprühen ($\pm 2 \frac{1}{2}$ - 3 ml). Die Behandlung nach 1 Woche wiederholen.

Junge Meerschweinchen (4-9 Wochen) und Ratten:

2x kurz besprühen (± 1 ml). Die Behandlung nach 1 Woche wiederholen.

Kaninchen älter als 4 Wochen: Das Fell leicht befeuchten und danach gut in die Haut einmassieren.

Die Behandlung nach 1 Woche wiederholen.

Hamster und Mäuse: nicht direkt besprühen, 1-2x ($\pm 0,3$ - 1 ml) auf die Hand sprühen und dann das Tier einschmieren.

Die Behandlung nach 1 Woche wiederholen.

Betroffene Stellen am Kopf können mit einem getränkten Tupfer behandelt werden. Verhindern Sie hierbei einen Kontakt mit Maul, Augen oder Nase.

Empfehlungen: Halten Sie kranke und gesunde Tiere getrennt. Behandeln Sie auch immer gesunde Tiere zum Schutz vor (Räude-)Milben. Vernichten Sie verwendetes Stroh etc. und reinigen Sie die Unterkunft gründlich mit Wasser und Seife. Sorgen Sie außerdem für ein gutes Futter, ausreichend Hygiene und genügend Platz, um eine Reinfektion zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen: Das Mittel nicht mit anderen Insektiziden und/oder Anti-Wurmmitteln kombinieren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit infizierte Tieren so gut wie möglich. Tragen Sie bei der Anwendung Kunststoff-Handschuhe. Nach der Verwendung gründlich die Hände waschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. **Nicht bei trächtigen Tieren verwenden.**

Lagerung: Kühl und dunkel lagern.

Wirkstoff: Ivermectin 0,02 %.