

---

## ISO-GEL®

### Ergänzungsfuttermittel

#### **Produktbeschreibung:**

Iso-Gel ist ein Ergänzungsfuttermittel mit einem hohen Gehalt an Ispaghula-Granulat, welches bei akuten intestinalen Absorptionsstörungen bei Hund und Katze, wie akuten Durchfall oder während der anschließenden Erholungsphase verwendet werden kann. Iso-Gel kann auch bei Verstopfung benutzt werden.

**Zusammensetzung:** Iso-Gel ist ein Granulat, das bis zu 90 % (w/w trocken) aus Ispaghula besteht; Iso-Gel ist Gluten-frei und hat keinen kalorischen Wert.

**Zieltierarten:** Hund, Katze

#### **Produktmerkmale:**

Da sich Ispaghula als Granulat in Wasser löst, entsteht ein Gel, welches im Darm Wasser bindet. Darüber hinaus wird Wasser auch auf indirekte Weise gebunden, da Iso Gel - Bestandteile durch die vorhandenen Darmbakterien abgebaut werden. Durch den Abbau größerer Moleküle in viele kleinere, nimmt im Darm der osmotische Wert zu, wodurch eine größere Wasserbindung erreicht wird. Infolgedessen wird die Konsistenz des Kots verbessert.

Iso-Gel regelt die Darmdurchfluss-Zeit: durch die Anreicherung der Menge an Kot erhöht sich der Inhalt des Darm, dies regt die Muskel-Aktivität an und verbessert den Muskeltonus und die Peristaltik der Darmwand. Iso-Gel kann damit nicht nur lange Durchflusszeiten bei Tieren, die unter Verstopfungen leiden, verkürzen, sondern auch den Durchfluss verlängern, dies hilft z.B. bei Durchfall.

#### **Empfohlen bei:**

Iso-Gel ist ein Ergänzungsfuttermittel, welches bei akuten intestinalen Absorptionsstörungen bei Hund und Katze, wie akuten Durchfall oder während der anschließenden Erholungsphase verabreicht werden kann. Durch die Regulierung der Darmfunktion kann ISO-Gel auch bei Verstopfungen verwendet werden, die z.B. durch Haarballen, nach der Entfernung der Anldrüse oder nach einer Perinealhernie verursacht wurden.

**Gebrauchsanweisung:**

Ist Indikativ und kann auf die individuellen Bedürfnisse

angepasst werden.

Hund: 2-5 Teelöffel von 3 ml, 1 bis 2x täglich  
über das Futter geben.

Katze: 2 Teelöffel von 3 ml, 1 bis 2x täglich  
über das Futter geben.

Empfohlene Anwendungszeit: 1-2 Wochen

In Absprache mit Ihrem Tierarzt kann diese Verwendungsdauer angepasst werden.

**Nicht verwenden bei:**

Bauchschmerzen, Erbrechen, bei einem Verschluss des Darmes

**Nebenwirkungen:** Blähungen

**Warnhinweise:**

Es wird vor der Verabreichung empfohlen den Rat Ihres Tierarztes einzuholen. Immer genug Wasser zur Verfügung stellen.

**Lagerung:** Bei Raumtemperatur (15-25 °C), außerhalb der Reichweite von Kindern.

**Haltbarkeit:** Siehe Verpackung

**Verpackung:** 1 Beutel mit 100 g, in einer Schachtel verpackt

**Hersteller:**

Aesculaap bv  
Mijlstraat 35  
Boxtel  
Niederlande