

B. NUR BD/2017/REG EN 3477/Fall 596898 14 NUR Reisfit, 40 mg Tablette für Hunde und Katzen

1. NAME UND ADRESSE DES HABERS Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte

2. NAME DES TIERARZNEIMITTELS Reisfit, 40 mg Tablette für Hunde und Katzen
Cyclinhydrochlorid

3. ARBEITSWEISE UND SONSTIGE DATEIEN> Je Tablette: Wirkstoff: Cyclizinehydrochlorid
40 mg

4. INDIKATION(EN) Verhinderung der Reisekrankheit.

5. KONTRA-INDIKATIONEN Nicht bei Tieren mit Epilepsie anwenden.

6. OPTIONEN - Sedierung - Koordinationsstörungen - Xerostomie - Wenn Sie schwerwiegende unerwünschte Reaktionen oder Reaktionen irgendwelcher Art feststellen, die nicht in diesem Merkblatt erwähnt sind, informieren Sie bitte Ihren Tierarzt.

7. ZIELTR(E) Hund und Katze

8. DOSIERUNG FÜR JEDE ZIELSPEZIES, VERABREICHUNGSWEG(E) UND VERWENDUNGSMETHODE. Verabreichungsweg: orale Dosierung: 4 mg Cyclizinehydrochlorid pro kg Körpergewicht (= 1 Tablette pro 10 kg Körpergewicht), eine halbe Stunde vor dem Transport zu verabreichen, ggf. Behandlung alle 6 Stunden wiederholen, maximal dreimal täglich.

9. ANWEISUNGEN FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄÙE VERWALTUNG

10. Wartezeit Nicht anwendbar.

11. LAGERUNG Unter 25°C halten. In der Originalverpackung aufbewahren. Nicht im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden.

12. HINWEIS(E) Besondere Warnhinweise für jede Tierart, für die das Tierarzneimittel bestimmt ist Nicht an sehr junge oder schwache Tiere verabreichen Nicht an Hunde und Katzen mit einem Gewicht von weniger als 2,5 kg verabreichen. Nicht während der Schwangerschaft, Stillzeit oder beim Legen verwenden. Überdosierung (Symptome, Notfallverfahren, Gegenmittel), falls erforderlich Die Toleranzgrenze von Cyclizin liegt etwa bei der 3-fachen therapeutischen Dosis. Bei geschwächten Tieren kann die Toleranzgrenze niedriger sein. Eine Überdosierung bei Hunden und Katzen kann zu Gleichgewichtsstörungen und einer Art von epileptischen Anfällen führen. Der Tierarzt sollte symptomatisch behandeln.

13. ENTSORGUNG Nicht verwendete Tierarzneimittel oder deren Rückstände sollten gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

14. DAS DATUM DER ÜBERPRÜFUNG DES ZULIEFERS 11. Juli 2017

15. ANDERE INFORMATIONEN REG NL 3477 REZEPTFREI